



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA  
AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 2312  
CNPJ Nº 05.149.125/0001-00

---

**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO (PSP) Nº 001/2023, PARA ADMISSÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA – PA EDITAL Nº 001/2023**

**RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA**

**QUESTÃO 01: RESPOSTA: DEFERIDO.** Retifica-se o gabarito da alternativa B para a alternativa A. As demais estão incorretas, pois a palavra **Menos**, nesse contexto, é um adverbio de intensidade e, como tal, é uma palavra invariável.

As demais alternativas fogem à regra, pois: a alternativa B apresenta a grafia incorreta; a C indica que as duas alternativas anteriores estão corretas e; a D aponta as duas erradas.

**QUESTÃO 11, 16, 17, 18 e 20: RESPOSTA: DEFERIDAS.** Questões **ANULADAS**, por não estarem correspondentes ao conteúdo programático contido no Edital 001/2023 do PSP para ACS do município de Nova Timboteua-PA.

**QUESTÃO 23: RESPOSTA: INDEFERIDO.** A doença chickungunya, se encaixa dentro do tema: Principais problemas da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas, conforme consta no item 11 do anexo II do Edital, por essa razão o recurso não deve ser acatado.

**Conteúdo: Principais problemas de Saúde da População e recursos existentes para o Enfrentamento dos problemas.**

**QUESTÃO 27: RESPOSTA: INDEFERIDO.** O termo Diabetes “tipo 2” (DM2) é usado para designar um tipo de diabete que tem como denominador comum uma relativa e progressiva deficiência de secreção de insulina associada a uma resistência à ação de insulina. Sobre os casos suspeitos e confirmados da doença marque a afirmativa correta:

- a) Dentre as complicações por DM2 estão a doença renal crônica, neuropatia, dislipidemia e infecções de repetição.
- b) O DM2 costuma ter evolução silenciosa, podendo permanecer sintomático por vários anos.
- c) Os sintomas clássicos são poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal podem estar presentes em ambos os tipos de diabete.
- d) O DM2 caracteriza-se como uma doença de etiologia multifatorial, associada à predisposição genética, idade avançada, excesso de peso, sedentarismo e hábitos alimentares saudáveis